

Tabella I. Distribuzione per classi di età in rapporto alle patologie del rachide (ernia discale lombare, protrusione discale lombare) nel campione e nei controlli

Classi d'età	Patologie erniarie controllo				Classi d'età	Patologie erniarie campione			
	Positivi		Negativi			Positivi		Negativi	
Femmine controllo	N°	%	N°	%	Femmine campione	N°	%	N°	%
20-29	-	-	9	100	20-29	-	-	11	100
30-39	-	-	28	100	30-39	5	9.1	50	90.9
40-49	4	9.3	39	90.7	40-49	4	6.5	57	93.5
50-59	1	5.3	18	94.7	50-59	2	12.5	14	87.5
> 59	-	-	-	-	> 59	-	-	-	-
Tot.	5	5.0	94	95.0	Tot.	11	7.5	136	92.5

Tabella II. Distribuzione delle femmine per anzianità lavorativa in rapporto alle patologie del rachide (ernia discale lombare, protrusione discale lombare e spondilolistesi)

Anni di lavoro	Patologie rachide Femmine Controllo			Patologie rachide Femmine Campione		
	Mal	Tot	%	Mal	Tot	%
≤5	-	23	-	-	71	0.0
5-9	-	20	-	1	27	3.7
10-14	2	20	10.0	9	41	21.9
≥14	4	36	11.1	4	8	50.0
Tot	6	99	6.0	14	147	9.5




Grafico Tabella II. Interpretazione grafica dei dati riportati nella tabella II. Percentuali di soggetti patologici rispetto all'anzianità lavorativa.